

Isomera ト共ニかはらさいこ其物デアル。變種名ヲ皆大文字デ記シタノハ FRANCHET ノ書ニアル通りニシタノデアルガ本來ハ當然小文字デ記スベキデアル。 (中井猛之進)

○FRANCHET 氏ノ取扱ツタ *Cyperus* ノ數種

FRANCHET & SAVATIER: Enumeratio Plantarum Japonicarum 第 2 卷 100 頁ニ *Cyperus nitens* L. トアルノハ *Juncellus serotinus* C. B. CLARKE みづがやつりデアル。又 101 頁ニアル *Cyperus flavescens* L. トアルノハ *Pycnus globosus* REICHENBACH めあぜがやつりデアル。又 103 頁ニアル *Cyperus japonicus* MIQUEL ハみづがやつりデアリ *Cyperus Iria* L. トアルモノ、中 SAVATIER no. 1374 ハ *Cyperus microiria* STEUDEL きがやつりデアル。104 頁ニアル *Cyperus Krameri* FRANCHET & SAVATIER ハ *Cyperus amuricus* MAXIMOWICZ ノ基本型即チ *Cyperus amuricus* var. *laxus* (FRANCHET & SAVATIER) NAKAI デアル。105 頁ノ *Cyperus Textori* MIQUEL ハきがやつりデアル。斯様ニ誤ガ多イカラ原標本ニツイテ一々當ツテ見ナイト西人ノ書イタ著書論文ノ記事ハ其儘鵜呑ミニスルノハ危険極マリナイコトデアル。 (中井猛之進)

○中肋ノ離脱




Fig. 1. *Codium spiralis* an example of midrib excurrent.

葉ノ中肋ハ通常基部ヨリ尖端部ニ達シ、時ニハ更ニ先端ヨリ突出スルモノデアルコトハ蓋シ常態デアラウ。然シマタ時ニハ葉尖ヨリ約 1 セ、メ程ノ手前デ葉面カラ完全ニ脱離シテ針狀ノ突起然タルコトモアル。其一例トシテ温室育チノ、へんえふばく一名くるとんイヤぼりねしあ原産ノ *Codium spiralis* (Fig. 1) ヲ舉ゲル事ニスル。(コノ種名ニ就テハ松崎直枝氏ニ負フ處アリ) 此ノ事實ニ就テハ BAILLEY ノ Encyclopedia Horticulture p. 818 ニモ圖ガ出テ居テ、中肋ノ脱離外卷スル事ヲ midrib excurrent ト述ベテアル。

之ニ似タ事ガ草木錦葉集卷之四第 22 丁ニ出テ居ル、即からたちばな (*Bladhia punctata* NAKAI)



Fig. 2. "Kumataka" a garden form of *Bladhia punctata* NAKAI in the Sômokukinyô-shyû published in 1829.